



× Cupressocyparis leylandii



Výška	5 - 6 m
Šířka	6-8m
Koruna	columnar to narrow pyramidal, dense crown
Kůra a větve	twigs light reddish brown, bark reddish brown, slightly flaking
List	pointed scales, dull medium green, evergreen
Květy	round, reddish-brown cones, 2 cm
Plody	C.J. Leyland, Leighton Park, Welshpool, Wales, 1888
Trny	Žádný
Jedovatost	Obvykle není jedovaté pro lidi, (větší) zvířata
Zadláždění	Netolerující zadláždění
Zóna otužilosti	7a (-17,7 do -15,0 °C)
Odolnost větru	good
Ostatní odolnost	Odolné větru
Použití	pobřežní zóny, průmyslové oblasti
Tvar	Vysokokmen, Vzorový jehličnan, Rostlina pro živý plot
Původ	Grote zuilvormige tot smal piramidale conifeer met een dichte vertakking, die gemakkelijk kan uitgroeien tot een boom van 15 tot 30 m hoogte. De bast is roodbruin en laat op latere leeftijd los in lange, vezelachtige platen. De jonge twijgen zijn eerst groengeel, later licht roodbruin. Het loof is dof middengroen. De boom groeit op alle gronden, mits goed doorlatend en voldoende vochtig, en verdraagt ook veel wind. Ze behoort, naast verschillende cultivars van Chamaecyparis lawsoniana en Thuja, tot de meest populaire haagplanten. De van nature smalle habitus is een voordeel bij het gebruik als haag en daarbij is de boom zeer goed te snoeien. Vanwege de krachtige groei moet er twee keer per jaar worden gesnoeid en dan ontstaat een zeer dichte haag. De boom ontstond in 1888 uit een kruising tussen Chamaecyparis nootkatensis en Cupressus macrocarpa. Nieuwe inzichten leidden ertoe dat C. nootkatensis in een ander geslacht werd ingedeeld (Xanthocyparis). Dit had tot gevolg dat de hybridesoo
Synonymum	× Cupressocyparis leylandii

Velký sloupovitý až úzce pyramidální jehličnan s hustým větvením, snadno dorůstající do výšky 15 až 30 m. Kůra je červenohnědá a později se odděluje do dlouhých vláknitých plátů. Mladé větvičky jsou zpočátku zelenožluté, později světle červenohnědé. Listy jsou matně středně zelené. Strom roste ve všech půdách, pokud jsou dobře odvodněné a dostatečně vlhké, a snáší také větrné stanoviště. Vedle různých kultivarů Chamaecyparis lawsoniana a Thuja patří k nejoblíbenějším rostlinám živých plotů. Jeho přirozeně úzký habitus je při použití jako živý plot

výhodou a navíc strom velmi dobře odnožuje. Vzhledem k jeho bujnému růstu by se měl stříhat dvakrát ročně, čímž vznikne kompaktní živý plot. Strom vznikl v roce 1888 křížením *Chamaecyparis nootkatensis* a *Cupressus macrocarpa*. Nové poznatky vedly k zařazení *C. nootkatensis* do jiného rodu (*Xanthocyparis*).