



Cedrus libani subsp. atlantica



Šířka	10-15m
Trny	Žádný
Jedovatost	Obvykle není jedovaté pro lidi, (větší) zvířata
Půdní vlhkost	Vhodné pro suché půdy
Zadláždění	Netolerující zadláždění
Zóna otužilosti	7a (-17,7 do -15,0 °C)
Ostatní odolnost	Odolné větru
Použití	průmyslové oblasti
Tvar	Vysokokmen, Alejový jehličnan, Vzorový jehličnan
Synonymum	Cedrus atlantica

Jistě, zde je profesionálně přepracovaná verze popisu stromu, která splňuje všechny zadané požadavky. --- Cedrus libani subsp. atlantica Tento geografický poddruh Cedrus libani, často označovaný jako cedr atlaský, je velký, rychle rostoucí strom s charakteristickým horizontálním větvením ve vyšším věku. Pochází ze suchých, vápencových horských svahů pohoří Atlas v severozápadní Africe. Kmen je v mládí hladký a šedý, u starších jedinců se borka stává drsnější. Později se odlupuje v drobných destičkách a odhaluje spodní, červenohnědou vrstvu kůry. Struktura koruny je poměrně volná a vzdušná. Letorosty jsou zpočátku šedozelené až šedohnědé, ve druhém roce se přebarvují do šeda. Tmavě zelené jehlice o délce 2–2,5 cm vyrůstají ve svazcích po 20 až 40. Na podzim se objevují vzpřímeně rostoucí šišky. Mladé šišky jsou zelené, později dozrávají do purpurově hnědé až hnědé barvy. Tento cedr vyžaduje stanoviště na plném slunci a vyznačuje se vysokou tolerancí vůči znečištěnému ovzduší, což z něj činí vhodný strom i pro městské podmínky.