




Pinus pinaster



Šířka	10-15m
Trny	Žádný
Jedovatost	Obvykle není jedovaté pro lidi, (větší) zvířata
Půdní vlhkost	Vhodné pro suché půdy
Zadláždění	Netolerující zadláždění
Zóna otužilosti	8a (-12,2 do -9,5 °C)
Ostatní odolnost	Odolné větru
Stromy pro zvířata a hmyz	Odolné větru, Potrava pro ptáky
Použití	pobřežní zóny, průmyslové oblasti
Tvar	Vysokokmen, Vícekmen, Vzorový jehličnan
Synonymum	Pinus maritima

Borovice přímořská (Pinus pinaster) je statný strom, který ve svém přirozeném areálu, především v pobřežních oblastech, roste na suchých a písčitých půdách. Výjimku tvoří Maroko, kde v horách vystupuje až do nadmořské výšky 2000 m. Po staletí se hojně využívala ke zpevňování písčinych dun a k produkci terpentýnu, díky čemuž se rozšířila a zplaněla i v jiných částech světa, například v Jižní Africe. Pinus pinaster tvoří zpočátku kulovitou korunu, která s věkem přechází ve vějířovitý tvar. Borka dospělých stromů je červenohnědá, s tmavšími a hlubokými rýhami. Tuhé, poměrně dlouhé jehlice mají leskle zelenou barvu a na všech stranách zřetelné řady průduchů. Štíhlé šišky jsou zpočátku purpurově hnědé, při dozrávání se zbarvují do světle hnědé. Pro svou citlivost na mraz se tato borovice nehodí pro plošné výsadby v severozápadní Evropě, uplatní se však v chráněných stanovištích, jako jsou terasy či velká atria. Výborně snáší mořský vítr a je tolerantní ke znečištění ovzduší.