



## Populus tremula 'Tapiau'



|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Šířka</b>                     | 3-5m                                                                             |
| <b>Trny</b>                      | Žádný                                                                            |
| <b>Jedovatost</b>                | Obvykle není jedovaté pro lidi, (větší) zvířata                                  |
| <b>Půdní vlhkost</b>             | Vhodné pro suché půdy, Odolné vůči krátkodobému zaplavení, Odolné vůči zaplavení |
| <b>Zadláždění</b>                | Netolerující zadláždění                                                          |
| <b>Zóna otužilosti</b>           | 2 (-45,5 do -40,1 °C)                                                            |
| <b>Ostatní odolnost</b>          | Odolné mrazu (WH 1-6), Odolné větru, Odolné posypové soli                        |
| <b>Stromy pro zvířata a hmyz</b> | Odolné mrazu (WH 1-6), Odolné větru, Odolné posypové soli, Cenné pro motýly      |
| <b>Použití</b>                   | bulváry a široké ulice, pobřežní zóny                                            |
| <b>Tvar</b>                      | Vysokokmen, Vícekmen                                                             |

Populus tremula 'Tapiau' je rychle rostoucí kultivar osiky s průběžným, rovným kmenem. Koruna je v mládí úzká, s věkem se rozrůstá do široce pyramidálního tvaru a v dospělosti bývá často širší než vyšší. Hladký šedý kmen doplňují žlutohnědé letorosty a husté větvení. Vzpřímeně rostoucí větve se na koncích mohou mírně ohýbat. Široce vejčité až okrouhlé listy mají tmavě zelenou barvu, na rubu jsou znatelně světlejší. Kultivar je odolný vůči pozdním mrazům. Uplatní se při výsadbách v doprovodné zeleni, ve volné krajině i jako parkový strom. 'Tapiau' pochází z výběru semenáčů z oblasti Tapiau v bývalém Prusku a množí se vegetativně. Zóna zimní odolnosti: 4