




Quercus coccinea



Šířka	8-15m
Podzimní zbarvení	Červená
Trny	Žádný
Jedovatost	Obvykle není jedovaté pro lidi, (větší) zvířata
Půdní vlhkost	Vhodné pro mokré půdy
Zadláždění	Netolerující zadláždění
Zóna otužilosti	5b (-26,0 do -23,4 °C)
Ostatní odolnost	Odolné mrazu (WH 1-6), Odolné větru, Odolné posypové soli
Použití	bulváry a široké ulice, průmyslové oblasti
Tvar	Vysokokmen, Zavětvěný strom, Vícekmen

Quercus coccinea, česky dub šarlatový, pochází ze smíšených opadavých lesů východní části Severní Ameriky. Vytváří širokou korunu s větvemi rostoucími téměř vodorovně. Borka je tmavě šedá až téměř černá a středně drsná. Tento druh se nápadně podobá dubu bahennímu (Q. palustris), klíčovým rozlišovacím znakem je však barva letorostů – u Q. coccinea jsou žlutohnědé, zatímco u Q. palustris olivově zelené. Listy jsou podlouhlé až oválné (někdy obvejčité), peřenolaločné se 7 až 9 laloky s pilovitě zubatým okrajem. Jsou mělčeji vykrajované než listy dubu bahenního, dorůstají délky 9–15 cm a šířky 6–11 (až 15) cm. Na podzim se listy zbarvují do intenzivní šarlatově červené. Po uschnutí zůstávají na větvích často až do poloviny zimy. Jednotlivé žaludy jsou přibližně z jedné třetiny kryty číškou, která je hustě porostlá krátkými, přitisklými šupinami.