




Zanthoxylum schinifolium



Ano

Šířka	3-4m
Podzimní zbarvení	Žlutá
Trny	Ano
Jedovatost	Obvykle není jedovaté pro lidi, (větší) zvířata
Zadláždění	Netolerující zadláždění
Zóna otužilosti	6 (-23,3 do -17,8 °C)
Ostatní odolnost	Odolné mrazu (WH 1-6), Odolné větru
Stromy pro zvířata a hmyz	Odolné mrazu (WH 1-6), Odolné větru, Cenné pro motýly
Použití	stromy do nádob, střešní zahrady
Tvar	Vysokokmen, Vícekmen

Žlutodřev vínobobovitý (*Zanthoxylum schinifolium*) roste z keřovitého habitu do podoby malého, někdy i vícekmenného stromu s kulovitou korunou. Na větvičkách se pod každým pupenem nachází plochý trn. Na starší kůře jsou tyto trny patrné jako drobné výrůstky. Elegantní, lichozpeřené listy jsou tvořeny 11 až 21 tmavě zelenými, podlouhle oválnými lístky s jemně vroubkovaným okrajem a vykrojenou špičkou. Listové vřetenno je lysé a na spodní straně nese jemné ostny. Na podzim se listy zbarvuje do žluta. V červenci a srpnu rozkvétají kompaktní květenství zelených až hnědozelených květů. Po nich následují drobné, kulovité a dužnaté měchýřky, které přecházejí ze zelené do hnědočervené barvy a obsahují černá semena. Podobně jako u druhu *Z. piperitum* se jeho semena v Japonsku melou a používají jako náhražka pepře. Jedná se o parkový strom s nízkými nároky na půdu.