



Acer davidii



Šířka	7-11m
Podzimní zbarvení	Žlutá, Oranžová, Červená
Trny	Žádný
Jedovatost	Obvykle není jedovaté pro lidi, (větší) zvířata
Zadláždění	Netolerující zadláždění
Zóna otužilosti	6a (-23,3 do -20,6 °C)
Ostatní odolnost	Odolné mrazu (WH 1-6), Odolné větru
Stromy pro zvířata a hmyz	Odolné mrazu (WH 1-6), Odolné větru, Cenné pro motýly
Použití	stromy do nádob, střešní zahrady
Tvar	Vysokokmen, Vícekmen

Javor davidův (*Acer davidii*) patří pro svou nápadně pruhovanou borku společně s *Acer capillipes* a *Acer rufrinerve* do skupiny takzvaných hadích javorů. Mladé výhony mají tmavě purpurově červenou barvu, kterou si uchovávají i během zimy. Na starších větvích a kmeni se tvoří charakteristické, šedobíle pruhované zbarvení. Listy jsou jen slabě laločnaté a na rozdíl od *A. capillipes* jsou na rubu podél žilnatiny ochlupené. Na mladých jedincích bývají listy trojčetné, zatímco u starších stromů laloky zcela postrádají. Jedná se o jednodomou dřevinu, samčí i samičí květy se tedy nacházejí na stejném exempláři. Kořenový systém je hustý, jemně větvený a kompaktní. Využití tohoto javoru je vhodné především v parcích a větších zahradách, jelikož hůře snáší zpevněné povrchy. Jako vysoce dekorativní dřevina se skvěle uplatní také ve smíšených okrasných výsadbách a okrajových pásích zeleně.