



## Acer rubrum



|                                  |                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Šířka</b>                     | 10-14m                                                      |
| <b>Podzimní zbarvení</b>         | Oranžová, Červená                                           |
| <b>Trny</b>                      | Žádný                                                       |
| <b>Jedovatost</b>                | Obvykle není jedovaté pro lidi, (větší) zvířata             |
| <b>Půdní vlhkost</b>             | Odolné vůči krátkodobému zaplavení, Odolné vůči zaplavení   |
| <b>Zadláždění</b>                | Tolerující částečné zadláždění                              |
| <b>Zóna otužilosti</b>           | 4 (-34,4 do -28,9 °C)                                       |
| <b>Ostatní odolnost</b>          | Odolné mrazu (WH 1-6)                                       |
| <b>Stromy pro zvířata a hmyz</b> | Odolné mrazu (WH 1-6), Cenné pro včely (medonosná rostlina) |
| <b>Použití</b>                   | bulváry a široké ulice                                      |
| <b>Tvar</b>                      | Vysokokmen, Vícekmen                                        |

Jistě, zde je přepracovaná verze textu, která splňuje všechny zadané požadavky. *Acer rubrum*, česky javor červený, je středně velký strom s kulovitou až kuželovitou korunou, která je hustě větvená a uzavřená. Ve svém přirozeném areálu v Severní Americe mohou exempláře dorůst až 25 m, v našich podmínkách dosahuje výšky okolo 15 m. Mladé letorosty mají výraznou červenohnědou barvu. Také řapík jasně zeleného listu je červený, přičemž na rubu je list modrozelený. Jeho podzimní zbarvení do oranžovočervených tónů patří k hlavním okrasným hodnotám. Červené, dvoudomé květy se objevují ještě před rašením listů. Plody dozrávají časně v létě a brzy opadávají. Strom vytváří silný kulový kořen s bohatým větvením postranních vláknitých kořenů. Na vápnatých půdách strom neprospívá a hůře roste; v těchto a rovněž v suchých půdách nedochází k intenzivnímu podzimnímu vybarvení. Hůře snáší vítr, zejména v přímořských oblastech. Mrazuvzdornost je dobrá. Nejefektivnější je *Acer rubrum* v plném podzimním olistění, přičemž nejintenzivnějšího zbarvení dosahuje na vlhkých, mírně kyselých stanovištích.