




## Acer rufinerve



|                                  |                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Šířka</b>                     | 5-6m                                                                      |
| <b>Podzimní zbarvení</b>         | Žlutá, Červená                                                            |
| <b>Trny</b>                      | Žádný                                                                     |
| <b>Jedovatost</b>                | Obvykle není jedovaté pro lidi, (větší) zvířata                           |
| <b>Zadláždění</b>                | Netolerující zadláždění                                                   |
| <b>Zóna otužilosti</b>           | 6a (-23,3 do -20,6 °C)                                                    |
| <b>Ostatní odolnost</b>          | Odolné mrazu (WH 1-6), Odolné větru                                       |
| <b>Stromy pro zvířata a hmyz</b> | Odolné mrazu (WH 1-6), Odolné větru, Cenné pro včely (medonosná rostlina) |
| <b>Použití</b>                   | stromy do nádob, malé zahrady                                             |
| <b>Tvar</b>                      | Vysokokmen, Vícekmen                                                      |

Acer rufinerve, česky javor rezavožilný, je velký keř, který často dorůstá do podoby vícekmenného stromu. Jeho volný habitus vytváří otevřenou, vázovitou korunu. Dorůstá výšky až 10 metrů, ačkoliv ve své domovině v Japonsku může dosáhnout až 12 metrů. V bezlistém stavu vynikají olivově zelené letorosty s nápadnými, bílošedými podélnými pruhy. Zelené, trojlaločné listy dosahují velikosti 7–15 cm na délku a přibližně 10 cm na šířku. Na podzim se listy zbarvují do plamenně oranžových až šarlatově červených odstínů, což je jeho nejvýraznější okrasný prvek. Vytváří mělký, hustě větvený kořenový systém. Jedná se o často pěstovaný druh ze skupiny tzv. pruhovaných javorů. Ačkoliv preferuje teplá stanoviště, během horkých letních dnů může na příliš slunných místech docházet k úpalu listů.