




Aesculus ×carnea



Šířka	10-15m
Trny	Žádný
Jedovatost	Obvykle není jedovaté pro lidi, (větší) zvířata
Zadláždění	Tolerující částečné zadláždění
Zóna otužilosti	6a (-23,3 do -20,6 °C)
Ostatní odolnost	Odolné mrazu (WH 1-6)
Stromy pro zvířata a hmyz	Odolné mrazu (WH 1-6), Cenné pro včely (medonosná rostlina)
Použití	bulváry a široké ulice
Tvar	Vysokokmen, Vícekmen
Synonymum	Aesculus rubicunda

Jírovec pleťový (Aesculus ×carnea) je kříženec druhů A. hippocastanum a A. pavia. V porovnání s jírovcem maďalem roste pomaleji a dosahuje menší velikosti. Jeho hustá, kompaktní koruna poskytuje hluboký stín. Dospělý strom dorůstá do výšky až 20 m a šířky 15 m. Mírně lesklé, vstřícné listy jsou dlanitě složené a dosahují velikosti až 15 cm. Raší brzy na jaře a na stromě vytrvávají dlouho do podzimu, kdy se zbarvují do žlutohnědých odstínů. Strom začíná kvést přibližně ve věku 8 až 10 let, kdy se objevují nápadné, růžově červené květy uspořádané ve vzpřímených latách o délce 15 až 20 cm. Kořenový systém je tvořen hluboko sahajícím křovítkem s bohatým postranním větvením. Vyžaduje dostatečně vlhké stanoviště a špatně snáší zpevněné povrchy, pokud mu není poskytnut dostatečně velký prokořenitelný prostor.