



Sorbus intermedia 'Brouwers'



Šířka	4-6m
Podzimní zbarvení	Žlutá, Oranžová
Trny	Žádný
Jedovatost	Obvykle není jedovaté pro lidi, (větší) zvířata
Půdní vlhkost	Vhodné pro suché půdy
Zadláždění	Tolerující zadláždění
Zóna otužilosti	5a (-28,8 do -26,1 °C)
Ostatní odolnost	Odolné mrazu (WH 1-6), Odolné větru
Stromy pro zvířata a hmyz	Odolné mrazu (WH 1-6), Odolné větru, Potrava pro ptáky
Použití	bulváry a široké ulice, stromy do nádob, střešní zahrady, pobřežní zóny
Tvar	Vysokokmen, Vícekmen

Kultivar jeřábu prostředního 'Brouwers' (Sorbus intermedia 'Brouwers') se vyznačuje vzpřímenějším růstem a pravidelnější korunou než původní druh. Jedná se o pomalu rostoucí strom s hustým větvením. Černošedá borka kmene zůstává dlouho hladká, ve vyšším věku se stává podélně rýhovanou. Mladé letorosty jsou šedohnědé až olivově hnědé, zpočátku plstnaté, ale brzy olysávají. Listy jsou laločnaté, s 5 až 9 páry laloků. Svrchní strana listů je tmavě zelená a mírně lesklá, zatímco spodní je kontrastně bíle plstnatá. Na podzim se listy zbarvují do žlutých až oranžovožlutých odstínů, ačkoliv podzimní vybarvení může být někdy nevýrazné nebo zcela chybět. Krémově bílé květy se vyznačují vůní typickou pro tento druh. Po odkvětu se tvoří oranžovočervené, vejčité až kulaté malvice uspořádané v malých chocholicích, které na stromě zůstávají až do října. Strom je větruvzdorný a dobře snáší sucho, proto se uplatní i v pobřežních oblastech. Oproti původnímu druhu plodí kultivar 'Brouwers' podstatně méně. Je rezistentní vůči bakteriální spále růžovitých (Erwinia amylovora).