



## Tilia cordata 'Greenspire'



|                                  |                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Šířka</b>                     | 8-12m                                                 |
| <b>Trny</b>                      | Žádný                                                 |
| <b>Jedovatost</b>                | Obvykle není jedovaté pro lidi, (větší) zvířata       |
| <b>Půdní vlhkost</b>             | Vhodné pro suché půdy                                 |
| <b>Zadláždění</b>                | Tolerující zadláždění                                 |
| <b>Zóna otužilosti</b>           | 4 (-34,4 do -28,9 °C)                                 |
| <b>Ostatní odolnost</b>          | Odolné mrazu (WH 1-6), Odolné větru                   |
| <b>Stromy pro zvířata a hmyz</b> | Odolné mrazu (WH 1-6), Odolné větru, Cenné pro motýly |
| <b>Použití</b>                   | bulváry a široké ulice, pobřežní zóny                 |
| <b>Tvar</b>                      | Vysokokmen, Zavětvěný strom, Vícekmen                 |

Jedná se o americkou selekci lípy srdčité *Tilia cordata* 'Greenspire', která se vyznačuje stejným růstem. V mládí tvoří pyramidální korunu s průběžným terminálem a šikmo vzhůru směřujícími větvemi. V pozdějším věku přechází tvar koruny do oválného až vejčitého. V dospělosti dosahuje výšky až 20 m a šířky přibližně 10 m. Kmen má tmavě hnědou, rýhovanou borku, letorosty jsou zelené až červenohnědé. Listy kultivaru 'Greenspire' jsou o něco větší než u původního druhu. Čepel je na bázi srdčitá a na vrcholu náhle zúžená do špičky. Rub listů má modrozelený nádech. Na začátku léta rozkvétají pronikavě vonící květy uspořádané v krátkých vrcholících. Světle zelený listen je o něco kratší než samotné květenství. Koncem léta dozrávají poměrně malé plody, zprvu šedě plstnaté, později lysé. Podobně jako původní druh *Tilia cordata* je i tento kultivar málo náchylný k napadení mšicemi. Oproti původnímu druhu se však vyznačuje slabším kotvením v půdě.