




Acer circinatum



Výška	8 - 10 m
Šířka	8-10m
Koruna	round, dark, dense crown
Kůra a větve	bark reddish brown, bark grey, smooth trunk, branches green
List	palmately lobed with 7 - 9 (11) lobes, up to about 9 cm long and 11 cm wide, matte green
Podzimní zbarvení	Žlutá, Oranžová, Červená
Květy	white with purple-red calyxes, about 1 cm in size, mid-April
Plody	single-seed, winged nutlets ,always paired
Trny	Žádný
Jedovatost	Obvykle není jedovaté pro lidi, (větší) zvířata
Zadláždění	Netolerující zadláždění
Zóna otužilosti	5 (-28,8 do -23,4 °C)
Odolnost větru	fairly
Ostatní odolnost	Odolné mrazu (WH 1-6)
Použití	bulváry a široké ulice
Tvar	Vysokokmen, Vícekmen
Původ	Western North America

Corylus avellana, česky líska obecná, je statný keř, který často dorůstá do podoby vícekmenného stromu s hustě větvenou, kulovitou korunou. Mladé letorosty jsou hnědé a jemně chlupaté, zatímco starší borka se po letech odlupuje. Matně zelené listy jsou rovněž ochlupené, na omak mírně drsné a na podzim se zbarvují do hnědožluté. Dekorativní samčí jehnědy jsou patrné již před zimou, ale rozkvétají až koncem února. Drobné červené samičí květy, vyrůstající z listových pupenů, jsou naopak nenápadné. Plody, lískové oříšky, dozrávají v září. Jsou částečně obalené v typické punčošce tvořené srostlými listeny a obsahují vysoké množství rostlinných tuků a bílkovin. Kořenový systém je citlivý na nedostatek vzduchu, proto líska vyžaduje dostatečně provzdušněnou a dobře odvodněnou půdu. V takových podmínkách je však na půdní typ nenáročná.