



Acer opalus



Výška	10 - 15 m
Šířka	5-10m
Koruna	ovoid / egg-shaped
Kůra a větve	branches brown brown, bark brown, later flaking off in plates
List	palmately lobed, 3-5 (7) lobes, 16-20 cm, mat green
Podzimní zbarvení	Žlutá, Oranžová, Červená
Květy	greenish yellow, with hairy pedicels, end of March
Plody	single-seed, winged nutlets, always paired
Trny	Žádný
Jedovatost	Obvykle není jedovaté pro lidi, (větší) zvířata
Zadláždění	Netolerující zadláždění
Zóna otužilosti	6 (-23,3 do -17,8 °C)
Odolnost větru	fairly
Ostatní odolnost	Odolné mrazu (WH 1-6)
Stromy pro zvířata a hmyz	Odolné mrazu (WH 1-6), Cenné pro motýly
Tvar	Vysokokmen, Vícekmen
Původ	Central and Southern Europe and Northwest Africa (Algeria and Morocco)

Jilm 'Camperdownii' (Ulmus 'Camperdownii') je působivý smuteční strom s mohutnými, převisajícími větvemi, které často dosahují až k zemi. Vytváří hustou, uzavřenou korunu. Roubuje se na podnož Ulmus glabra, zpravidla ve výšce 2 až 2,5 m. Kmen mladých stromů má hladkou, stříbrošedou kůru, jež se věkem mění na tmavě šedou s černými brázdami; kůra starých kmenů je síťovitě rozpraskaná. Mladé letorosty jsou hnědé, jemně plstnaté a pokryté lenticelami, později olysávají a nabývají šedohnědého odstínu. Velké, hustě nahloučené listy vytvářejí souvislý pokryv, který zcela zakrývá větve. Jsou oboustranně chlupaté, s hrubě pilovitým okrajem a na omak drsnou svrchní stranou. Charakteristickým znakem je asymetrická báze čepele, která překrývá řapík. Výrazné květní pupeny se rozvíjejí těsně před rašením listů. Kultivar je citlivý na grafiozu jilmů.