




Sorbus alnifolia var. submollis



Výška	8-12 m
Šířka	4-8m
Koruna	avoid to round
Kůra a větve	dark grey
List	dark green
Podzimní zbarvení	Oranžová, Červená
Květy	white, flowers in May-June
Plody	yellow to orange and red
Trny	Žádný
Jedovatost	Obvykle není jedovaté pro lidi, (větší) zvířata
Zadláždění	Tolerující částečné zadláždění
Zóna otužilosti	4 (-34,4 do -28,9 °C)
Odolnost větru	fairly
Ostatní odolnost	Odolné mrazu (WH 1-6)
Stromy pro zvířata a hmyz	Odolné mrazu (WH 1-6), Potrava pro ptáky
Použití	bulváry a široké ulice, úzké ulice, stromy do nádob
Původ	U.S. National Arboretum, Washington D.C., USA, 2003

Přírodní odrůda submollis se od základního druhu Sorbus alnifolia příliš neliší. Je to malý až středně velký strom o výšce 8-12 m s uzavřenou, vejčitou až kulovitou korunou. Kůra je tmavě šedá a hladká, mladé větvičky jsou zelenohnědé s nápadnými červenohnědými listovými pupeny. Oválné listy poněkud připomínají listy Alnus spaethii, jsou však menší. U druhu Sorbus alnifolia jsou listy oboustranně holé. U var. submollis je spodní strana listů mírně chlupatá. I na starších listech je toto ochlupení stále patrné v žilnatině. Na podzim se listy zbarvují do atraktivní růžové, oranžové a červené barvy. V květnu až červnu se otevírají bílé květy v květenstvích širokých asi 5 cm. Zatímco květní stopky druhu S. alnifolia jsou bez chloupků, květní stopky var. submollis jsou chlupaté. Po květech následují kulaté až oválné plody, které se zbarvují do žluté až červené barvy. Pro dobré nasazení plodů je nutné křížové opylení. Proto vždy vysazujte alespoň dva stromy blízko sebe. Sorbus alnifolia var. submollis se vyskytuje ve střední Číně, Koreji a Japonsku. Strom roste nejlépe v dobře propustné, úrodné půdě. Zóna mrazuvzdornosti 4.